

قرص کافئین ۲۰۰ میلی‌گرم در بسته‌بندی ۶۰ عددی

- توضیحات عمومی (مکانیسم اثر): کافئین به عنوان محرک سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد. مکانیسم اصلی کافئین مهار گیرنده آدنوزین در مغز می‌باشد که منتج به افزایش آگاهی، هوشیاری و عملکرد می‌گردد.
- موارد مصرف: افزایش دهنده انرژی و کاهش خستگی، افزایش قدرت عضلانی، افزایش متابولیسم و افزایش تمرکز می‌باشد.
- مقدار و نحوه مصرف عمومی: مقدار مصرف پیشنهادی این فرآورده، روزانه ۱ الی ۳ عدد با فاصله قبل از غذا یا تمرین ورزشی یا طبق دستور پزشک می‌باشد. از مصرف روزانه بیش از ۳ قرص خودداری نمائید.
- بعضی از غذاها و نوشیدنی‌ها ممکن است حاوی مقادیری از کافئین باشند که ممکن است مصرف همزمان آن‌ها با این فرآورده موجب افزایش ضربان قلب، بی‌قراری و عصبانیت گردد.
- مصرف این مکمل در افراد کمتر از ۱۲ سال توصیه نمی‌گردد.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود هر گونه حساسیت به فرآورده قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید.

موارد احتیاط مصرف:

در افراد با نارسایی کبدی، کلیوی و بیماران قلبی-عروقی با احتیاط مصرف گردد.
از مصرف مقادیر بیشتر از حد مجاز این فرآورده اجتناب نمائید.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی: مصرف در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود مگر به صلاحدید پزشک معالج.

تداخلات دارویی:

فنی توفین، آلپورینول، قرص‌های ضد بارداری خوراکی، آسپرین، لیتیوم، تیوفیلین و کلوزاپین؛ در صورت استفاده همزمان از سایر داروها حتماً پزشک خود را مطلع نمائید.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی در مصرف این مکمل شایع نمی‌باشد و وابسته به غلظت سرمی دارو در خون می‌باشد:

سیستم قلبی-عروقی: تپش قلب

سیستم عصبی: بی‌خوابی، بی‌قراری، سردرد، وز وز گوش، افزایش تحریک‌پذیری

سیستم گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، درد معده

سایر عوارض: تکرر ادرار، واکنش‌های حساسیتی

مصرف بیش از حد (مسمومیت): در صورت بروز عوارض شدید یا مصرف بیش از حد توصیه شده دارو، از مصرف دارو خودداری نموده و سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمائید.

شرایط نگهداری: فرآورده را دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمائید.



NOYAFIT®

Caffeine Tablet 200 mg, 60 Tablets in a Bottle

- **Product Description (mechanism of action):** Caffeine is a drug which acts as a stimulant upon the central nervous system. Caffeine's main mechanism concerns antagonizing adenosine receptors. Adenosine causes sedation and relaxation when it acts upon its receptors, located in the brain. Caffeine prevents this action and causes alertness and wakefulness.
- **Indications:** Boost Energy Level, Promote Exercise Performance, Enhance Fat Loss & Metabolism, Increased Alertness & Focus
- **Administration:** according to your caffeine tolerance, take 1 tablet, up to three times daily. Allow 3 to 4 hours between servings. Do not exceed 3 tablets daily.
- **Contraindication:** Hypersensitivity to product components.
- **Precautions:** Use with caution in hepatic impairment, renal impairment, and cardiovascular disease. Avoid consuming excessive amounts of this product.
- **Lactation & pregnancy:** Consumption during pregnancy and lactation is not recommended unless at the discretion of the treating physician.
- **Drug interactions:** Phenytoin, allopurinol, oral contraceptive pills, aspirin, lithium, theophylline and clozapine; Be sure to tell your doctor if you are taking any other medicines at the same time.
- **Side effects:** Side effects of this supplement are not common and depend on the serum concentration:
Cardiovascular system: palpitations
Nervous system: insomnia, restlessness, headache, tinnitus, increased irritability
Digestive system: nausea, vomiting, diarrhea, stomach pain
Other side effects: frequent urination, allergic reactions
- **Overdose:** In case of severe side effects or overuse, stop taking the product and call healthcare provider immediately.
- **Storage conditions:** store in a cool, dry place less than 30° c.

Website information: www.noyan-pharma.com



NOYAN
RAYA PAJOUHAN